

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 27-3-68 765502

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE RENNES (Tél. 40-00-74)
(CALVADOS, COTES-DU-NORD, FINISTÈRE, ILLE-ET-VILAINE, MANCHE, MORBIHAN, ORNE)
Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Route de Fougères - RENNES (face à l'Hippodrome)
C. C. P. RENNES 9404-94

ABONNEMENT ANNUEL
25 F

SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN N° 90

26 MARS 1968

AVERTISSEMENTS

POMMIER - POIRIER

TAVELURES -

Les périthèces, qui se forment dans les feuilles mortes de pommier et de poirier, peuvent émettre dès cette époque des ascospores, certains étant arrivés à maturité depuis déjà quelques jours.

Des contaminations sont donc susceptibles de se produire, lors des prochaines pluies, sur les variétés ayant atteint ou dépassé le stade C3-D. En conséquence, il convient d'effectuer un traitement sur celles-ci dès les prochains jours. Sur les variétés à débourrement plus tardif, cette application sera réalisée dès qu'elles atteindront le stade précité.

INFORMATIONS

POMMIER

OIDIUM -

Sur les rameaux contaminés l'année précédente, la maladie apparaît dès le débourrement. Au cours des périodes chaudes, le champignon peut se développer rapidement et devenir très nuisible sur certaines variétés, si aucune mesure n'est prise pour enrayer son extension.

La lutte consiste d'abord à supprimer les pousses atteintes (mesure indispensable dans les jeunes vergers) et à les détruire par le feu.

La lutte chimique peut être réalisée par des traitements effectués à cadence régulière sous forme de poudrage ou de pulvérisation.

Pour le choix du produit, ainsi que pour la dose d'emploi, se reporter à "l'Edition spéciale".

CAROTTE

MOUCHE DE LA CAROTTE (carottes véreuses) -

On lutte contre cet insecte juste avant semis en traitant le sol avec l'un des produits suivants :

- Diazinon : 8 kg de matière active à l'hectare
- Diéthion : 6 kg de matière active à l'hectare
- Trichloronate : 2,5 kg de matière active à l'hectare

Après application, enfouir légèrement l'insecticide par une façon superficielle.

Les traitements par épandage de "granulés" semblent plus efficaces que ceux effectués par pulvérisation.

FRAISIER

MALADIE DES TACHES ROUGES DU FEUILLAGE (*Mycosphaerella fragariae*) -

Pour lutter contre cette maladie, il convient d'effectuer le premier traitement dès le départ de la végétation du fraisier. Il est nécessaire d'assurer une protection continue jusqu'à la formation des fruits.

La fréquence des traitements sera fonction de la rapidité d'accroissement de la surface foliaire et de l'importance des pluies.

Employer le Manèbe à raison de 2,5 kg de matière active à l'hectare.

L'Ingénieur chargé des
Avertissements Agricoles,

G. PAITIER.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux,

J. DELOUSTAL.